

予防接種スケジュール(2013年4月1日現在)

定期接種の標準的な期間 定期接種可能な期間 任意接種の推奨期間 接種可能な期間

ワクチン	種類	乳児期							幼児期					学童期					青年期							
		6週	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6~8ヵ月	9~11ヵ月	12~15ヵ月	16~17ヵ月	18~23ヵ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
四種混合(DPT-IPV) 三種混合(DPT) ポリオ(IPV)	不活化		①	②	③			④(注1)		(7.5歳未満)					(四種混合は15歳未満)											
BCG	生				①																					
麻疹、風疹(MR)	生								①							②	②は5歳以上7歳未満(小学校就学前1年間)で接種									
日本脳炎	不活化											①	②	③	(7.5歳未満)					④						
		特別対象者(H7/4/2~H19/4/1生まれの者)は、20歳未満の間に4回接種のうち不足分を接種可能 (20歳未満)																								
二種混合(DT)	不活化																				①					
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化	①	②	③														④(注2)								
肺炎球菌結合型(PCV7)	不活化	①	②	③														④(注3)								
ヒトパピローマウイルス	2価 4価																						①②③(注4) (小6~高1相当の女子)			
B型肝炎	不活化	①	②														③(注5)									
ロタウイルス	1価 5価	①	②														計2回、生後24週未満に完了すること									
		①	②	③														計3回、生後32週未満に完了すること								
水痘(水ぼうそう)	生								①			②	②は①後3ヵ月以上あけて2歳未満で接種													
おたふくかぜ	生								①						②	②は5歳以上7歳未満で接種(MR②と同時期)										
インフルエンザ	不活化								毎年(10月、11月などに) ① ②													13歳より ①				

注1: ③-④の間は6ヵ月以上あけ、標準的には③後12-18ヵ月の間に接種 注2: ③-④は7-13ヵ月あける 注3: ③-④は60日以上あける 注4: 2価は0、1.6ヵ月後、4価は0.2、6ヵ月後に接種 注5: ①-②は4週間隔、③は①から20-24週間経過後